



PROF. JEFFRY KASHUK

GENERAL SURGERY
AESTHETIC MEDICINE

הנחיות לאחר טיפול בפיסורה אנאלית באמצעות הזרקת בוטוקס

1. תודה שהגעת למרפאתנו והבעת את האמון שלך בנו ובטיפול שלנו בפיסורה האנאלית. שלך.
2. בדרך כלל, תהיה רמה משתנה של כאב ואי נוחות ביום ובלילה הראשונים לאחר הטיפול. רוב המטופלים מגלים שהבילוי באמבטיה חמה מקל על רוב הכאב הזה. אל תהסס לעשות זאת בתדירות לפי הצורך!
3. אין להניח קרמים או טיפול אחר באזור פי הטבעת בלילה הראשון. לאחר מכן, לפי ההוראות שלנו, ייתכן שתהיה החדרת האצבע המורה פעמיים ביום עם קרם אנטרולין כפי שתואר על ידי פרופסור קשוק.
4. יש להתחיל מיד בשימוש בנורמלקס ושמן פרפין ולהמשיך. עליך להשתמש בהם במטרה לקבל צואה רכה אך לא לשלשול. התאם את המינון בהתאם לעובי הצואה שלך.
5. זה נפוץ שיש קצת דם בימים הראשונים. שמור פד בתחתונים בשביל זה.
6. אם הכאבים חזקים יותר מ-48 שעות, ואינם מוקלים על ידי משככי כאבים ואמבטיה חמה, עליך להיות איתנו בקשר והפרופסור ישוחח איתך ואולי יציע ביקור חוזר. ככלל, יכולה להיות גם תחושת צריבה כלשהי אפילו עד שבוע או 10 ימים כאשר תהליך הריפוי נמשך.
7. אנו לא קובעים באופן שגרתי ביקור מעקב, אך שוב, אנו מעוניינים לדעת אם אתה מרגיש שהכאב אינו פוחת ואתה חושב שיכולה להיות בעיה או בעיה לעיתים, למטופלים עם טחורים קיימים יכולה להיות מעט נפיחות ואי נוחות מטחורים, בהם נוכל לטפל בקלות במשרד. בכל שאלה, אנא צור איתנו קשר.
9. איננו ממליצים על כל דחיפה לתפקוד המעי. תן לזה לבוא באופן טבעי עם המרככים. אם אין פעילות אפילו 48 שעות, זה בסדר. המרככים יעזרו לפתור כל עצירות.
10. אנו ממליצים על מגבונים לחים לתינוק במקום נייר טואלט סטנדרטי לשימוש אישי.
11. כמעט כל המטופלים מדווחים על שיפור משמעותי בממוצע 7 ימים לאחר הטיפול. יש אומרים שהם מרגישים משופרים בהרבה אפילו תוך 48-72 שעות. המפתח הוא באמת לנסות לעקוב אחר המלצות הבית שלנו בצורה מדויקת ככל האפשר.

לקביעת תורים

03-732-6770
053-933-8701

ירושלים

המרכז הרפואי קניון מלחה,
שער נרקיס קומה 4

תל אביב

הברזל 11, קומה 6
סוויטה 5A